


# NeoEx

## ANWENDUNGSBEREICH

- NeoEx ein gelbes Insektizid-Granulat für die Bekämpfung von Fliegen (besonders in Viehställen).
- Fraß- und Kontaktinsektizid
- hervorragende Sofortwirkung sowie eine Dauerwirkung von bis zu 6 Wochen.
- enthält neben dem Wirkstoff Azamethiphos (als aktiven Wirkstoff) attraktive Lockstoffe (z.B. Zucker) für Stallfliegen (*Musca autumnalis*) und Stubenfliegen (*Musca domestica*)
- für eine nachhaltige Fliegenreduzierung ist ein **kombinierter Einsatz von DESINTEC® NeoEx gegen adulte Fliegen und DESINTEC® CyroEx gegen Larven** in der Gülle zu empfehlen.



## ANWENDUNGS- und DOSIERUNGSEMPFEHLUNG

NeoEx ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Verwendung an häufigen Aufenthaltsorten (Fenster, Säulen, Türen usw.) der Tiere. Um eine hohe Wirkung zu erzielen, sind mehrere Fraßstellen anzulegen. **Dosierung: 400 g Granulatköder sind ausreichend für 200 m<sup>2</sup> Stallgrundfläche.**

### 1. Anwendung als STREUKÖDER:



NeoEx wird an Stellen aufgetragen, an denen sich Fliegen am häufigsten aufhalten, d. h. so nah wie möglich an den Tieren, jedoch außerhalb ihrer Reichweite. Das Granulat NeoEx wird als dünne Schicht auf waagerechte Oberflächen (Kunststoff oder Pappschalen) aufgestreut.

### 2. Anwendung als STREICHMITTEL:



NeoEx wird mit warmem Wasser gemischt bis das Granulat gut aufgelöst ist. Es wird bevorzugt an vielen Stellen (für 200 m<sup>2</sup> Stallgrundfläche ca. 30 Streifen a 20 x 30 cm) mit einem Pinsel an Wänden, Pfosten, Leitungen usw. in Tiernähe (jedoch außerhalb der Reichweite der Tiere) aufgetragen. Zur Bekämpfung können Desintec Fliegenlandeplätze eingesetzt werden. Die Tafeln können mit NeoEx bestrichen werden und z.B. oberhalb von Breiautomaten aufgehängt werden.

## ALLGEMEINE BEACHTUNG

- während der Anwendung können die Nutztiere im Stall bleiben. Es muss aber sichergestellt sein, dass die Tiere den Belag nicht erreichen bzw. ablecken können. Ein Besprühen der Tiere sowie Über- und vor allem Unterdosierungen sind zu vermeiden.
- verschmutzte, poröse, saugfähige oder feuchte Flächen nicht behandeln.
- bei starker Staubentwicklung im Stall ist die Behandlung bei Bedarf zu wiederholen.



## NeoEx

- bestrichene Flächen nehmen eine gelbe Farbe an
- bei Bedarf nach 2 bis 3 Wochen die Anwendung wiederholen. Den Köder ersetzen, wenn er mit toten Fliegen oder einer Schmutzschicht bedeckt ist. Mücken werden nicht bekämpft.

### Wirkstoff

10 g/kg Azamethiphos

### SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

**Gebindegrößen:** 400 g Dose und 2 kg Eimer

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG EINSCHLIEßLICH  
DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!  
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONS-MITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!  
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

**BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG  
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**