

# PREFOAM +

**Gebrauchsfertige, ausschließlich für die professionelle Anwendung**

**vorgesehene Flüssigkeit**

**EUTERHYGIENE VOR DEM MELKEN**

**DESINFEKTION DER ZITZEN DURCH SCHAUMAUFBRINGUNG**

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt: L-(+)-Milchsäure2g +Salicylsäure0,099g

Gemeldetes Biozid-Produkt nach ChemBiozidMeldeV / Registriernummer: N-40008

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für  
die Hygiene im Veterinärbereich

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

## **SPEZIFIKATION**

- . Klare Flüssigkeit, farblos
- . Reiner pH-Wert :  $2,9 \pm 0,3$
- . pH-Wert bei 10 g/l : Nicht verfügbar
- . Dichte bei 20°C :  $1,011 \pm 0,01$  g/cm<sup>3</sup>
- . Frostpunkt : -1 °C

## **EIGENSCHAFTEN**

- . PREFOAM + vereinigt den Wirkstoff LSA ® (aktiver Komplex aus Hydroxysäuren) mit Tensiden.
- . Der LSA ®-Komplex verleiht PREFOAM + eine zugleich schnelle und weitreichende bakterizide und levurozide Wirkung.

. PREFOAM + enthält eine einzigartige Kombination tensidischer Substanzen, die leicht die Bildung eines Schaums zulassen, welcher zum einen sehr gut an Zitzen haftet und zum anderen leicht abgewischt werden kann.

. Die im LSA ®-Komplex enthaltene Milchsäure und die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von Propylenglykol tragen zur Geschmeidigkeit verleihenden Wirkung von PREFOAM + für die Haut bei.

## **ANWENDUNGSBEREICH**

Gebrauchsanweisung:

PREFOAM + ist ein gebrauchsfertiges bakterizides und levurozides Desinfektionsmittel für die Zitzendesinfektion vor dem Melken.

Schnell wirksam: Bakterizide Wirkung gegen Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis innerhalb von 30 Sekunden und levurozide Wirkung gegen Candida albicans innerhalb von 1 Minuten.

Vor der Anwendung des Mittels Zitzen von sichtbaren Verunreinigungen befreien.

Schaumbecher mit PREFOAM + füllen.

Vor dem Melken PREFOAM + durch Schaumaufbringung der Zitzen über die komplette Länge anwenden.

1 Minuten einwirken lassen.

Vor dem Anlegen des Melkzeugs Zitzen prinzipiell vorsichtig mit einem Einwegtuch oder einem wiederverwendbaren Eutertuch (ein Tuch pro Kuh) abwischen.

Bei jedem Melken anwenden.

Applikationsgeräte regelmäßig mit heißem Wasser reinigen

## **VERPACKUNG**

Kanister 0,5l Weiß 0,5kg

Kanister 5l Weiß 5kg (karton 4x5Kg)

Kanister 10l Weiß 10kg

Kanister 22l Weiß 20kg

Fässchen 60l Dunkelblau 60kg

Fass 120l Dunkelblau 120kg

Fass 220l Dunkelblau 200kg

IBC 1000l Natürlichen Farbe 1000kg

Das Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

### **SCHUTZMAßNAHMEN**

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hyprod.com>

### **GESETZLICHE REGELUNG**

Benutzen Sie das Produkt mit Vorsicht. Vor jedem Gebrauch ist die Etikette sowie die Informationen bezüglich des Produktes zu beachten.

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.