

InsektEx pour-on

ANWENDUNGSBEREICH

DESINTEC® InsektEx pour-on ist eine gebrauchsfertige Lösung zur äußeren Anwendung bei Rindern für die Bekämpfung von Fliegen und Gnitzen. Das registrierte Biozidprodukt auf Pyrethroid-Basis ist ausschließlich bei Rindern (besonders während der Weideperiode im Sommer) einsetzbar. Es ist allgemein bekannt, dass Insekten wie Fliegen und Gnitzen Krankheitsüberträger sein können. Als eine wirksame Hygienemaßnahme ist die Bekämpfung dieser Insekten unerlässlich. Unabhängig von dieser Hygieneproblematik führt die Insektenbelästigung bei Rindern für sehr viel Unruhe und Stress. Die Unruhe wird durch das ständige Schwanzschlagen und Kopfzucken erkennbar. Im Melkstand sorgen die Abwehrbewegungen der Tiere durch das häufigere Abschlagen von Melkzeugen auch für zusätzlichen Stress bei dem Melkpersonal. Die Anwendung von DESINTEC® InsektEx pour-on sorgt für eine geringere Belästigung der Tiere insbesondere durch Weidelästlinge (z.B. Augenfliegen, Weidestechfliegen, Bremsen etc.).

ANWENDUNGS- und DOSIERUNGSEMPFEHLUNG

Dosis DESINTEC® InsektEx pour-on:

bei Kälber/Rinder mit einem Körpergewicht bis 250 kg: 10 ml je 100 kg

bei Rinder/Kühe mit einem Körpergewicht zwischen 250-800 kg: 25 ml insgesamt (!Höchstdosierung!)

Das Gewicht der Tiere ist richtig zu bestimmen. Eine Über- und Unterdosierung ist zu verhindern. Zur Erreichung eines optimalen Schutzes ist eine gleichzeitige Behandlung von allen Tieren einer Herde empfehlenswert. Die Gesamtdosis von DESINTEC® InsektEx pour-on ist auf der Rückenlinie (vom Kopf bis zum Schwanzansatz) der Rinder aufzugießen. Dabei ist darauf achten, dass circa 1/4 der Gesamtdosis auf dem Kopf verteilt wird. Das Produkt darf nicht in die Augen der Tiere gelangen! DESINTEC® InsektEx pour-on sollte nur auf gesunde Hautpartien aufgetragen werden. Die dunkelblaue Farbe der gebrauchsfertigen Lösung sorgt bei der Behandlung der Tiere gleichzeitig für eine Markierung. Eine Doppelbehandlung von Tieren wird dadurch verhindert.

Im Stall ist für eine nachhaltige Fliegenreduzierung ein **kombinierter Einsatz** von DESINTEC® InsektEx pour on und **DESINTEC® CyroEx gegen Larven** in der Gülle oder im Mist empfehlenswert.

DESINTEC® InsektEx pour-on sollte weder von Tieren noch von Menschen oral (innerlich) aufgenommen werden.

WIRKUNGSDAUER

Alle Tiere einer Herde sind gleichzeitig zu behandeln. DESINTEC® InsektEx pour-on hat bei gesicherter Empfindlichkeit der Fliegenpopulation vor Ort auf Grund seiner besonderen Formulierung eine lange Wirkungsdauer von bis zu 7-10 Wochen. Empfehlenswert ist eine Wiederholung der Anwendung in Abständen von 11 Wochen. Resistenzen von Pyrethroiden können jedoch gegenüber von Weide- und Stallfliegen (sowohl stechende und nicht- stechende Fliegen) nicht ausgeschlossen werden. Die Wirkungsdauer kann variieren.

Frist für die Nutzung von Milch: 0 Tage

Frist für die Nutzung vor dem Schlachten: 3 Tage

WIRKSTOFF

36 g/L Permethrin (CAS 52645-53-1)

InsektEx pour-on

SICHERHEIT und LAGERUNG

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein: Arzt aufsuchen, wenn Krankheitssymptome auftreten.

Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt: Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken: Reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen.

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Wenn möglich, ihm dieses Datenblatt vorlegen.

Falls nicht vorhanden, Verpackung oder Etikett zeigen.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Nicht unter +8°C lagern oder einfrieren. Vor Frost schützen. Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 30 Wochen.

Gebinde: 1 ltr. Dosierflasche und 2,5 ltr. Flasche (inkl. Dosierpistole)

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG EINSCHLIEßLICH
DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONS-MITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

**BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**